

中風病患者接受舌針治療後重獲自由

莊伯伯（75 歲）因中風合併老年痴呆、假性球麻痺等症，而一度失去吃喝、走動甚至說話的自由。

一家醫院的言語治療師、物理治療師甚至醫生認為莊伯伯康復機會渺茫。連家屬也作了最壞的打算。

然而，在接受舌針治療（「治療」）後，他已可以吃喝及自由走動，並逐漸重拾說話能力。

莊伯伯在接受治療前因腦部血管栓塞而中風（缺血性中風），不能吃喝或說話。

此外，他在中風前患有中度老人痴呆症及帕金森症。

中風後入住護老院

莊伯伯在中風後入住護老院，依靠鼻飼管喝營養奶。

爲了防止他拔掉鼻飼管，他的手要帶上手掌約束袋，並綑綁在椅子或床，因而限制他的行動，同時令他情緒抑鬱，脾氣暴躁。

接受治療後重獲自由

幸運的是，在接受第二十一次治療後，莊伯伯已可擺脫鼻飼管，直接回家並重獲自由，不用回到護老院。

醫治老人痴呆症和帕金森症

中風後他的老人痴呆症比中風前更嚴重，而他的智商與行爲跟三歲小孩差不多。因此，他需要重新學習適應日常生活。

由於在治療中同時醫治老人痴呆症和帕金森症，莊伯伯因而可在回家第一個星期逐漸恢復部份自我照顧能力，如大小便、洗澡等，而當時他的體能已差不多恢復正常，有時反應能力甚至比中風前更快。

重拾吃喝能力

莊伯伯在接受第一次治療後已重拾吞口水的 ability，於接受第二次治療後已能夠喝水，並在接受治療數天後能夠進食流質食物。

走路不穩、手軟弱無力

中風前莊伯伯走路時身體向前傾，會越走越快，不能控制走路速度，甚至有仆倒

的危險，而他的手時常震動，不能用筷子。中風後他的手變得軟弱無力。

治療後步伐穩定、手回復靈活

在接受數次治療後，莊伯伯的下肢已靈活得多，步伐穩定，手亦恢復力量，不震動，靈活到可用筷子。

重新學習講話

在接受數次治療後，莊伯伯逐漸重拾講話能力，偶爾可以說一兩句比較清楚的話，尤其是發脾氣的時候，亦可重複其他人說的一些單詞。

面部表情更為豐富

中風後莊伯伯見到熟識的人只能以有限的面部表情表達情感，神情呆滯。

在接受治療後，他能以手勢、動作或更為豐富的面部表情表達情感，常常面露笑容。

流口水及吞嚥情況有改善

中風前莊伯伯常常流口水，喝水及吃東西時會噎著。

接受治療後他只偶爾流口水，喝水及吃東西時偶爾仍會稍為噎著，尤其是急速喝水及吃東西時。

不再小便失禁

莊伯伯以往尿頻，容易小便失禁，但在接受數次治療後，尿頻情況已有明顯改善，不再小便失禁。

及時獲得適當治療的幸運兒

全球有數以千萬計的人士中風、患老人痴呆症或帕金森症（包括影星米高霍氏）。莊伯伯很幸運，能及時獲得適當治療，有機會逐漸康復，而不用在護老院以半植物人的狀態渡過餘生。

舌針研究給全人類帶來希望

舌針研究給一些傳統治療無法醫治的病人帶來希望，並為提供快捷、有效及經濟的治療鋪路。

發送自病患者家屬

FRANKIE" <askfrankie@yahoo.com