

用舌針治療假性球麻痺的臨床研究

中文摘要

背景介紹:

採用微針的方法在舌頭上扎針以治療 125 例患有假性球麻痺的病人，包括男性 89 位，女性 36 位，年齡介乎 40 至 78 歲；其中 29 人的療程持續 3 個月，96 人的療程多於 3 個月。致病原因，64 例是由腦梗塞及腦萎縮等多種病發所致，45 例是單純多發性腦梗塞所致，而 16 例是因單純腦萎縮及其他疾病所致。

方法:

治療方法：用小針扎舌頭的穴位，因應病人的症狀而選取適當的穴位下針，5 次為一療程。

結果與討論:

用舌針治療了 125 例假性球麻痺患者，其中 79 人(佔 63.2%)完全治愈，36 人有明顯療效(佔 28.8%)，10 人有療效(佔 8%)，總有效率為 100%。連帶病人原有的病也一起明顯地改善了的有 23 例(18.4%)，98 例有改善(78.4%)，4 例無效(3.2%)。有 57 例只接受一個療程的治療，其中 19 例得以康復(33.33%)，28 例有明顯效果(49.12%)，10 例有療效(17.54%)。另外 68 人接受 2 個或以上的療程，60 人得以康復(88.24%)，8 人有顯著效果(11.76%)。兩組之間存在著明顯的差異，接受兩個治療療程的一組結果較只接受一個療程的一組佳($P < 0.01$)。有 29 人的發病期是 3 個月內，經治療後其中 22 人完全恢復(75.86%)，6 人有明顯效果(20.69%)，1 人有療效(3.45%)。餘下 96 例的發病期多於 3 個月，經治療後其中 57 例完全恢復(59.38%)，30 例有顯著療效(31.25%)，9 例有效(9.38%)，沒有很大差異存在於兩組之間，說明了舌針治療假性球麻痺的療效並沒有受到患者本身發病期長短的影響。訪問了 58 位接受舌針治療了 2 個月以上的病患，表示 2—4 個月內病情皆沒有復發；3 例表示在 5—6 個月後出現輕微症狀，但假性球麻痺的復發率是 0。這說明了治療效果頗佳。

結論

假性球麻痺是因中風而引發並且涉及腎臟、心臟、及脾臟的問題。當在舌頭上針灸時，藉此打通了神經管道，促進了腎臟、心臟、及脾臟的功能，進而達到治療的效果。

發佈之學術會議：

「世界針灸聯合會第五屆世界針灸學術大會」暨「第五屆會員大會」

地點：韓國首爾

日期：2000年11月13-15日